

Antigifcentrum  
**NIEUWSBRIEF**

APRIL 2014

[www.antigifcentrum.be](http://www.antigifcentrum.be)



**WIST JE DAT...**

een overdosis paracetamol de lever ernstig kan beschadigen?

**IN DEZE NIEUWSBRIEF**

[Is paracetamol wel zo veilig?](#)

[Enkele cijfers over geneesmiddelen en het Antigifcentrum](#)



**070 245 245**

GENEESMIDDELEN

## IS PARACETAMOL WEL ZO VEILIG?

Paracetamol is wereldwijd een van de meest gebruikte pijnstillende en koortsverlagende middelen. Het staat bekend als een relatief veilig geneesmiddel dat ook goed te gebruiken is voor kinderen, ouderen en bij zwangerschap. Maar zoals voor elk medicijn is het belangrijk de maximale hoeveelheden te respecteren.

### HOEVEEL IS TE VEEL?

- Voor een volwassene bedraagt de **maximale dagelijkse dosis paracetamol 4 gram** (4 tabletten van 1 gram of 8 tabletten van 500 mg).
- Bij kinderen is dat maximaal 4 x 10 à 15mg/kg lichaamsgewicht.

**Wees aandachtig voor een overdosering.** Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als men bij hevige hoofd- of tandpijn in korte tijd meerdere pillen tegelijk inneemt, zonder voldoende tussenpauze. Of bij onvrijwillige inname door kinderen van zoete siropen die

**Antigifcentrum**

Militair Hospitaal Koningin Astrid  
Bruynstraat 1 - 1120 Brussel  
T +32 2 264 96 36  
F +32 2 264 96 46

[info@poisoncentre.be](mailto:info@poisoncentre.be)  
[www.antigifcentrum.be](http://www.antigifcentrum.be)

### GENEESMIDDELEN EN HET ANTIGIFCENTRUM:

- Jaarlijks ontvangt het Antigifcentrum ongeveer 20.000 oproepen over

paracetamol bevatten.

Een **combinatie van geneesmiddelen die paracetamol bevatten**, kan ook tot een overdosis leiden. Paracetamol wordt verkocht onder verschillende merknamen en het is niet altijd van de merknaam af te leiden of een geneesmiddel paracetamol bevat. Raadpleeg de bijsluiters om dergelijke misverstanden te voorkomen.

## WAT BIJ EEN OVERDOSIS?

Een overdosis paracetamol kan de lever ernstig en blijvend beschadigen, wat potentieel dodelijk is. Duidelijke symptomen treden vaak pas na 24 tot 48 u op. Bij een vermoeden van overdosering is het belangrijk om onmiddellijk de huisarts of het Antigifcentrum te contacteren. Als er sprake is van een overdosis, moet zo snel mogelijk een tegengif (acetylcysteïne) toegediend worden in het ziekenhuis.

**Paracetamol is en blijft een veilige pijnstiller, maar kan bij verkeerd gebruik de lever ernstig beschadigen. Wees aandachtig voor overdosering!**



- De barbecue als bron van CO-intoxicatie? Het gebeurt vaker dan je denkt...

geneesmiddelen!

- Ze vertegenwoordigen 52% van de producten waarvoor het Antigifcentrum oproepen ontvangt.
- Meer dan 6.000 oproepen gaan over vergissingen bij het gebruik van geneesmiddelen (overdosering of het gebruik van een verkeerd product).
- Een duizendtal oproepen gaan over ongewenste effecten van medicijnen.

Wens je zelf graag een onderwerp voor te stellen voor onze nieuwsbrief, dat kan. Stuur ons een [e-mail](#) en wie weet wordt jouw suggestie besproken in één van onze volgende nieuwsbrieven.

Voor dringende vragen over vergiftigingen kan je dag en nacht terecht op ons **gratis nummer 070 245 245**.

Ken je iemand die zich wil inschrijven voor onze nieuwsbrief? Dat kan steeds via onze [website](#).

Bezoek onze website op [www.antigifcentrum.be](http://www.antigifcentrum.be) voor meer informatie

© 2014 Belgisch Antigifcentrum

[Uitschrijven](#)